

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:	MANCOZEB 80 WP
INGREDIENTE ACTIVO:	Mancozeb
NOMBRE QUÍMICO:	Combinación del ión zinc (2%), ión manganeso (16%) con etilen-bisditiocarbamato (62%)
GRUPO QUÍMICO:	Ditiocarbamato.
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:	800 g/kg WP (Polvo Mojable)
MODO DE ACCIÓN:	Contacto, preventivo.
TOXICIDAD:	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. LD50 producto comercial: dermal > 2.000 mg/kg Oral > 5.000 mg/kg
ANTÍDOTO:	No existe antídoto específico. Tratamiento número cinco.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Fungicida recomendado para el control de enfermedades fungosas en Hortalizas, cereales, cultivos industriales, espárragos, frutales, vides y plantas ornamentales. Posee efecto residual de 7 a 14 días.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Plagas	Dosis HL/ agua Kg/ha	Observaciones	Carencias (días)
Papas	Tizón temprano Tizón Tardío	180 a 240	Desde 5-15 cm. de 1.5 a 2.0 altura, cada 7 a 10 días, mientras dure la amenaza de la enfermedad.	7
	Fusariosis	300	Inmersión de semilla dejar secar antes de plantar.	
Cebollas	Mildiú	180 a 240	Cuando amenaza la	21
Espárragos	Roya	180 a 240 1.5 a 2.5	Aplice después de cosecha, sólo al follaje mientras persista la enfermedad, 4 aplicaciones cada 4 días.	
Tomates	Tizón Temprano Tizón Tardío Botritis	180 a 240 1.5 a 2.5	Desde el arraigamiento de las plantas o desde la emergencia. Cada 7 a 10 días.	8
	Frutales: Almendros Ciruelos	Cloca Tiro de Munición	180 a 240 6 a 8	Aplice durante el invierno y repita antes que abran los botones florales.
Damascos Guindos Cerezos Duraznero Nectarinos	Tizón de la flor	180 a 240 6 a 8	Primera aplicación: botón rosado en almendros durazneros y nectarinos; botón rojo en damascos; puntas verdes en ciruelos; botón blanco en cerezos y guindos. Repita al 25% y 75% de flor y caída de pétalos.	
Frutales	Tizón de la flor	240 10	Precosecha. Si existen condiciones favorables, aplicar 4 y 2 semanas antes de cosecha.	10

Manzanos Perales	Venturia	180 a 240 6.5 a 8.5	Cada 7 días desde puntas verdes a caída de pétalos. Cada 14 días después de caída de pétalos e inmediatamente después de cada lluvia.	Manzanos 21 Perales 15
Uva de Mesa y Vinífera	Botritis	2.0 a 3.0	Inicie los tratamientos a la primera flor, repetiendo para mantener protegido el follaje hasta la cuaja.	Hasta cuaja

(*) Use la dosis mínima bajo condiciones normales de prevención de las enfermedades; bajo condiciones extremas, que favorezcan estas enfermedades, use la dosis máxima, con intervalos de aplicación más cortos. En caso de lluvia, deberá repetirse la aplicación.

PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD:

No posee acción curativa por lo que siempre se debe usar en forma preventiva. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se debe esperar hasta que la aplicación se haya secado para reingresar al área tratada.